

**تأثير مواعيد الزراعة في حاصل ونوعية عدة تراكيب وراثية من زهرة الشمس *Helianthus annuus* L.**

الخنساء حسين فنون/كلية الزراعة/جامعة المثنى *

بهي كريدي جلاب /كلية الزراعة/جامعة المثنى

Article InformationReceived Date
2016/12/12
Accepted Date
2017/2/16**Keywords**Sunflower
Genotypes
Sowing dates**المستخلص**

أجريت الدراسة خلال الموسم الربيعي 2014 في حقول المزرعة الإرشادية في ناحية النجمي والتي تبعد 43 كم شمال شرقي مدينة السماوة مركز محافظة المثنى ، بهدف دراسة تأثير التراكيب الوراثية ومواعيد الزراعة على الحاصل ومكوناته ونسبة الزيت لمحصول زهرة الشمس. تضمنت الدراسة 45 وحدة تجريبية شملت عاملين هما ثلاثة تراكيب وراثية (Flame و Tarsan 1018 و Cartago) ولخمسة مواعيد زراعية هي (1 شباط و 15 شباط و 1 آذار و 15 آذار و 1 نيسان) ، استخدم تصميم القطع المنشقة Split Plot Design بثلاثة مكررات . وظهرت النتائج تفوق التركيب الوراثي Tarsan 1018 في كل من (عدد البذور في القرص و دليل الحصاد) بمعدلات بلغت 858.20 بذرة ، 40.31 % على التوالي ، وتفوق الصنف Flame في كل من (وزن 100 بذرة و حاصل النبات الفردي والحاصل الكلي ونسبة الزيت) فقد بلغت معدلاتها (3.96 غم ، 34.58 غم ، 2.29 طن.هـ⁻¹ ، 41.26 %) . أما بالنسبة لمواعيد الزراعة فقد تفوق الموعد الثاني 15 شباط في عدد البذور في القرص بمعدل بلغ 907.40 بذرة ومن دون فارق معنوي عن الموعد الثالث 1 آذار الذي بلغ 903.00 بذرة ، وتفوق الموعد الثالث 1 آذار في كل من (وزن 100 بذرة ، حاصل النبات الفردي والحاصل الكلي ، دليل الحصاد ونسبة الزيت) بمعدلات بلغت (4.63 غم و 42.05 غم و 2.79 طن.هـ⁻¹ و 43.34 % و 41.99 %) على التوالي .

*بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الاوّل

Plant Date Hold in quality Several genotypes from the sun flower *Helianthus annuus* L.ALKhanasa Hussain Fanfoon
Yahyaa Kuraidy Chillab
Agric. College- AlMuthanna Univ.**Abstract**

This study was carried out during the spring season of 2014 at the guiding farm of Al-Nejmy village, Al-Samawa. The objective of study was to investigate the effect of sowing dates on the growth, yield, yield components, particularly oil. 45 experimental units were included to represent two factors the 1st was sowing dates (1February, 15 February, 1March, 15 March, 1 April). While the second was denoted to cultivars (Flame, Tarsan 1018 and Gartago). The second planting date was the best, as compared to others in the seed number in the disc average of 907.40. 3rd date revealed superiority over others in weight of 100 seeds, yield of plant , total yield , harvest index and oil percentages 4.63gram , 42.05gram, 2.79ton per hectare, 43.34% and 41.99%, respectively. Tarsan 1018 exceeded other cultivars in seed number per disk and harvest index (858.20 and 40.31%, respectively). Flame showed superiority in weight of 100 seed, yield plant, the percentage total yield and the oil (3.96g, 34.58 g, and 2.29 ton per hectare and 41.26 % , respectively).

*Corresponding author: E-mail alkhansaa@yahoo.com

Al- Muthanna University All rights reserved

العالمي (عزيز ، 2002 و 2003 ، Meric et al.) . تحتوي بذوره على نسبة عالية من الزيوت تصل الى 50 % (2000) ، Syed et al الذي يمتاز الزيت بانخفاض سيولته إلى جانب انخفاض نسبة الاحماض الدهنية المشبعة فيه وارتفاع نسبة حامضي الأوليك واللينوليك وهذان الحامضان يشكلان نسبة 85 – 95 %

المقدمة

يعد محصول زهرة الشمس *Helianthus annuus* L. من المحاصيل الزيتية المهمة في العالم والتي تزرع من أجل زيتها ، الذي يعد من الزيوت الصالحة للتغذية البشرية . ويحتل المرتبة الثالثة بعد فول الصويا ، والسلمج في كمية الزيت على المستوى

من النسبة الكلية للحوامض الدهنية ، في بذوره وهذه النسبة تختلف بحسب التركيب الوراثي لزهرة الشمس البيئية المختلفة (2000 Katerji at el و Adbel- motagally and Osman ، 2010).

يعتبر محصول زهرة الشمس ذا أهمية اقتصادية كبيرة في مجالي القطاع الزراعي والصناعي إذ يعتمد القطاع الصناعي على استخدام الزيوت النباتية بوصفه مادة أولية لأغلب الصناعات، كصناعة الصابون والأصبغ ، والأدوية، والورق، والبلاستيك، ومستحضرات التجميل، وفي صناعة الزبدة النباتية، وفي منتجات الخبز والبسكويت ، وتستخدم كسبة بذوره علفاً جيداً لحيوانات المزرعة لاحتوائها على نسبة 28-42 % بروتين و 20-22 % كاربوهيدرات و بحدود 6 % دهن ، أما الأجزاء الخضرية فستخدم علفاً أخضر وفي صناعة السايلاج ، كما تستخدم بذور هذا المحصول في تغذية الطيور والإنسان ، (طيفور ورشيد، 1990) (العودة وآخرون ، 2009).

نجحت زراعته في ظروف بيئة ومناخية متباينة وتعتبر البيئة العراقية ملائمة لزراعته ، أن من أسباب تدني إنتاج محصول زهرة الشمس في العراق مرتبط بعوامل عدة منها وراثية ومنها زراعية كموايد الزراعة وعمليات خدمة التربة والمحصول ، للتقلبات المناخية نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري وما رافقها من تأثيرات كبيرة اصبحت الحاجة لدراسة تأثير اختلاف موعد الزراعة لتراكيب الوراثة مختلفة من زهرة الشمس في الحاصل ونسبة الزيت فيها .

المواد وطرائق العمل

أجريت التجربة خلال الموسم الربيعي 2014 في حقول المزرعة الإرشادية في ناحية النجمي والتي تبعد 43 كم شمال شرقي مدينة السماوة مركز محافظة المثنى في تربة طينية . وقد تم تحليل التربة قبل الزراعة بأخذ عينات عشوائية من أماكن مختلفة من الحقل وبعمق يتراوح ما بين 0-30سم ومزجت جيداً وجففت هوائياً وبعدها نخلت بمنخل ذو فتحات سعة 2 ملم ، ويوضح الجدول رقم (1) الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة .

تضمنت التجربة 45 وحدة تجريبية شملت جميع التوافيق ما بين العوامل المدروسة وتكراراتها بين التركيبين الوراثيين وهما Tarsan 1018 و Cartago والصنف Flame ولخمسة موايد زراعية هي (الموعد الأول (1 شباط) والموعد الثاني (15 شباط

والموعد الثالث (1 آذار) والموعد الرابع (15 آذار) والموعد الخامس (1 نيسان) . وأستخدم تصميم الألوام المنشقة Split Plot Desing وبثلاث مكررات العامل الاول المواعيد والعامل الثانوي التراكيب الوراثة. وتم حرث أرض التجربة حراثتين متعامدتين قبل الزراعة باستخدام المحراث القلاب وتم تنعيمها وتقسيمها تبعاً للتصميم المستخدم . واحتوت الوحدة التجريبية الواحدة على 3 مروز وبطول 3 م ، والمسافة بين مرز واخر هي 75 سم ، والمسافة بين جورة واخرى هي 20 سم وتم وضع البذور بواقع ثلاث بذرات بكل جورة على عمق (3-5) سم (الساهوكي وآخرون ، 1994) . وبعد الريا التعبيرية زرعت البذور تحت مستوى خط الماء لضمان الرطوبة وتقليل ضرر الأملاح وفصلت الوحدات التجريبية بمسافة 50 سم وبين القطاعات بمسافة 1 م سمدت التجربة بالسماد الفوسفاتي بمعدل 80 كغم.ه⁻¹ على هنية دفعة واحدة قبل الزراعة وسمدت باليوربا 46 N وأضيفت على دفتين الأولى عند الزراعة ، والثانية في مرحلة تكوين البراعم الزهرية (Schneider and Miller ، 1981) وبواقع 200 كغم.ه⁻¹ بطريقة النثر (الراوي ، 1998) . وتم اجراء خف النباتات بعد البزوغ النباتات وعند مرحلة 2-3 أوراق حقيقة بترك نبات واحد في الجورة ، وتم الري حسب حاجة النبات وبعد التأكد من حصول التلقيح تم تغطية الأقراص بأكياس الكلايس المتقبة لغرض حمايتها من أضرار الطيور .

تم قياس صفات الحاصل ومكوناته ونسبة الزيت لعشرة نباتات عشوائية لكل وحدة تجريبية وشملت (عدد البذور في القرص عن طريق تفريط القرص وعد كل البذور التي يحتويها التي شملت البذور الممتلئة والفاغرة. ووزن 100 بذرة حسبت لعشرة أقراص من كل معاملة. والحاصل الفردي للنبات غم.نبات⁻¹ تم حسابه بعد تفريط القرص الزهري وفصلت بذورها ووزنها . والحاصل الكلي للبذور (طن .ه⁻¹) = معدل حاصل البذور . نبات⁻¹ × الكثافة النباتية .ه⁻¹ و تم حول إلى طن .ه⁻¹ . ودليل الحصاد % = دليل الحصاد %
$$\frac{\text{الحاصل البذور (غم. نبات)}}{\text{الحاصل الحيوي (غم. نبات)}} \times 100$$
 ونسبة الزيت % أخذت عينة عشوائية من كل معاملة لتقدير محتوى الزيت في البذور باستخدام جهاز Soxhlet وعلى أساس الوزن الجاف للبذور وفقاً للطريقة المذكورة في (A . O . A . C ، 1980) باستخدام المذيب العضوي (الهكسان) وعلى درجة حرارة (69 °C) .

جدول (1). يبين الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل قبل الزراعة*.	
التحليل	النسب
PH التربة	7.8
EC التربة ديسي سيمنز . م ⁻¹	4.7
الطين	48.17
المفصولات %	21.80
الرمل	30.1
الغرين	طينية
نسجه التربة	26.22
النتروجين الجاهز ملغم . كغم ⁻¹	12.17
الفسفور الجاهز ملغم . كغم ⁻¹	26.65
البوتاسيوم الجاهز ملغم . كغم ⁻¹	
*أجريت التحاليل في مختبر خصوبة التربة /كلية الزراعة/جامعة المثني	

النتائج والمناقشة

1- عدد البذور في القرص

فقد أعطى أعلى معدل بلغ 907.40 بذرة وهو بذلك لم يختلف معنوياً عن الموعد الثالث 1 آذار والذي بلغ معدله 903.00 بذرة متفوقاً على باقي المواعيد المدروسة . ويعود السبب في ذلك إلى التباين في متغيرات الظروف البيئية السائدة لكل موعد مثل الضوء والرطوبة النسبية وبشكل خاص تأثير درجات الحرارة . أما عن تأثير التداخل بين التراكيب الوراثية ومواعيد الزراعة فقد اعطت التوليفة المتكونة من الصنف Flame والموعد الزراعي الثالث 1 آذار اعلى معدل في عدد البذور بلغت قيمته 991.00 بذرة ، في حين اعطت التوليفة المتكونة من التركيب الوراثي Cartago والموعد الزراعي الخامس 1 نيسان اقل معدل بلغ 606.80 بذرة.

يلاحظ من جدول رقم (2) أن التركيب الوراثي Tarsan 1018 باعطاء أعلى معدل عدد البذور في القرص بلغ 858.20 بذرة متفوقاً على الصنف Flame الذي أعطى معدل عدد بذور بلغ 816.60 بذرة متفوقاً في ذلك على التركيب الوراثي Cartago الذي أعطى أقل معدل لهذه الصفة بلغ 710.00 بذرة . ويعود سبب ذلك إلى الاختلاف في طبيعة التركيب الوراثي ومدى قابليته الأصناف المدروسة . وتتفق هذه النتيجة مع ما وجدته العبيدي (2000) . أما مواعيد الزراعة فقد تفوق الموعد الثاني 15 شباط

جدول (2). تأثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية وتداخلهما في عدد البذور في القرص لزهرة الشمس

متوسط المواعيد	التراكيب الوراثية			موعد الزراعة
	Tarsan 1018	Cartago	Flame	
754.2	723.7	732.1	806.8	2/1
907.4	990.3	821.6	910.3	2/15
903.0	979.4	738.6	991.0	3/1
725.9	876.0	650.9	650.9	3/15
684.2	721.8	606.8	724.1	4/1
	858.20	710.00	816.60	متوسط الاصناف
	(المواعيد X الاصناف)	التراكيب الوراثية	المواعيد	قيمة
	42.33	18.93	24.44	L . s . d (0.05)

يبين جدول (3) تفوق الصنف Flame في هذه الصفة بإعطاء أعلى معدل بلغ 3.96 غم ومن دون فارق معنوي عن التركيب الوراثي

2- وزن 100 بذرة (غم)

لكل منهم بلغت 3.39 و3.56 و3.90 غم على التوالي . ويعود السبب في ذلك إلى باختلاف موعد الزراعة وتأثيرها في معظم العمليات الفسلجية بانعكاس ذلك في تراكم المادة الجافة وانتقالها إلى المصب (البذرة) . اما عن تأثير التداخل بين التراكيب الوراثية ومواعيد الزراعة فقد تفوق الصنف Flame في الموعد الثالث المزروع في 1 آذار معطياً اعلى معدل بلغ 5.30 غم ، في حين سجل التركيب الوراثي Cartago في الموعد الاول المزروع في 1 شباط اقل معدل لهذه الصفة بلغ 2.81 غم .

Tarsan 1018 الذي أعطى معدل بلغ 3.65 غم في حين سجل التركيب الوراثي Cartago أقل معدل لوزن 100 بذرة بلغ 3.31 غم والسبب في ذلك يعود إلى الاختلاف التراكيب الوراثية فيما بينها في مَدّة تراكم المواد الغذائية وكذلك اختلاف قابليتها التحويلية للمواد الغذائية نتيجة اختلاف تراكيبها الوراثية ، وتتفق هذه النتائج مع ما وجدته عبد المجيد وآخرون (2011) . أما عن تأثير المواعيد الزراعية فقد تفوق موعد الزراعة الثالث 1 آذار معطياً أعلى معدل لهذه الصفة بلغ 4.63 غم في حين لم يختلف معنوياً كل من الموعد الأول 1 شباط والثاني 15 شباط والرابع 15 آذار فقد أعطت معدلات

جدول (3) . تأثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية وتداخلهما في وزن (100) بذرة لزهره الشمس

متوسط المواعيد	التراكيب الوراثية			موعد الزراعة
	Tarsan 1018	Cartago	Flame	
3.39	3.16	2.81	3.76	2/1
3.56	3.22	3.50	3.69	2/15
4.63	4.43	4.16	5.30	3/1
3.90	4.53	3.19	3.96	3/15
2.88	2.94	2.89	2.82	4/1
	3.65	3.31	3.96	متوسط الاصناف
	(المواعيد X الاصناف)	التراكيب الوراثية	المواعيد	قيمة
	1.16	0.52	0.67	L . s . d (0.05)

واعطى الموعد الخامس 4/1 أقل معدل لهذه الصفة بلغ 19.16 غم . ويعزى السبب في ذلك إلى تفوق الموعد الثالث 1 آذار في صفة وزن 100 بذرة الذي أدى بدوره إلى زيادة الحاصل . اما عن تأثير التداخل بين التراكيب الوراثية ومواعيد الزراعة فقد اعطى الصنف Flame وفي الموعد الثالث المزروع 1 آذار اعلى معدل حاصل نبات بلغ 51.99 غم ، في حين سجل التركيب الوراثي Cartago في الموعد الخامس المزروع 1 نيسان أقل معدل لهذه الصفة بلغ 17.63 غم .

3- حاصل النبات (غم.نبات⁻¹)

أظهرت بيانات جدول رقم (4) تفوق الصنف Flame على باقي التراكيب الوراثية المدروسة حيث سجل أعلى معدل بلغ 34.58 غم متفوقاً على التركيب Tarsan 1018 الذي أعطى معدل بلغ 30.09 غم في حين سجل التراكيب الوراثي Cartago أقل معدل لهذه الصفة بلغ قيمته 23.62 غم . ويعود السبب إلى طبيعة التركيب الوراثي للصنف Flame وكذلك تفوقه في صفة وزن 100 بذرة مما أدى إلى زيادة حاصل النبات . أما عن تأثير مواعيد الزراعة فقد تفوق موعد الزراعة الثالث 1 آذار معنوياً على باقي المواعيد الزراعية مسجل معدل بلغ 42.05 غم متفوقاً على باقي المواعيد .

جدول رقم (4) تأثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية وتداخلهما في حاصل البذور للنبات الفردي (غم) لزهره الشمس

متوسط المواعيد	التراكيب الوراثية			موعد الزراعة
	Tarsan 1018	Cartago	Flame	
25.70	29.24	20.59	27.28	2/1

31.90	28.73	28.73	38.51	2/15
42.05	43.87	30.28	51.99	3/1
28.34	29.38	20.86	34.80	3/15
19.16	19.54	17.63	20.30	4/1
	30.09	23.62	34.58	متوسط الاصناف
	(المواعيد X الاصناف)	التراكيب الوراثية	المواعيد	قيمة
	9.28	4.15	5.36	L . s . d
				(0.05)

لهذه الصفة بلغت قيمته 1.30 طن هـ¹ . ويعزى سبب انخفاض الحاصل في الموعد الخامس 1 نيسان إلى انخفاض مكونات الحاصل (عدد البذور في القرص ووزن 100 بذرة والحاصل للنبات) في المواعيد المتأخرة ، وتتفق هذه النتيجة مع ما وجدته الجبوري (1988). اما عن تأثير التداخل فقد اعطى الصنف Flame مع الموعد الثالث المزروع في 1 آذار اعلى معدل لصفة الحاصل الكلي بمعدل بلغ 3.46 طن هـ¹ ، في حين اعطى التركيب الوراثي Cartago والموعد الخامس المزروع في 1 نيسان اقل معدل لهذه الصفة بلغ 1.18 طن هـ¹.

4-حاصل البذور الكلي (طن.هـ¹)

يشير جدول رقم (5) إلى تفوق الصنف Flame في صفة حاصل البذور بلغ معدله 2.29 طن هـ¹ متفوقاً على التركيبين الوراثيين Tarsan 1018 و Cartago اللذين اعطيا معدلات بلغت 2.01 و 1.58 طن هـ¹ على التوالي . ويعود السبب في تفوق الصنف Flame في هذه الصفة إلى تفوقه في وزن 100 بذرة وحاصل النبات الفردي ، وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكره رشيد ومحمد (1994) . أما عن مواعيد الزراعة فقد تفوق موعد الزراعة الثالث 1 آذار معنوياً على باقي المواعيد الزراعية المدروسة حيث سجل معدل بلغ 2.79 طن هـ¹ في حين سجل الموعد الخامس أقل معدل

جدول رقم (5) تأثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية وتداخلهما في الحاصل الكلي للبذور لزهرة الشمس التراكيب الوراثية

متوسط المواعيد	Tarsan 1018	Cartago	Flame	موعد الزراعة
1.73	1.94	1.45	1.81	2/1
2.12	1.89	1.91	2.56	2/15
2.79	2.91	2.01	3.46	3/1
1.88	1.95	1.38	2.31	3/15
1.30	1.38	1.18	1.34	4/1
	2.01	1.58	2.29	متوسط الاصناف
	(المواعيد X الاصناف)	التراكيب الوراثية	المواعيد	قيمة
	0.60	0.26	0.34	L . s . d
				(0.05)

5

Cartago اللذين اعطيا معدلات بلغت 30.75 و 29.19 % على التوالي واللذين لم يختلفا معنوياً عن بعضها . ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف طبيعة التراكيب الوراثية. اما مواعيد الزراعة فقد تفوق موعد الزراعة الثالث 1 آذار على باقي المواعيد حيث أعطى معدل

دليل الحصاد %

أوضح جدول (6) تفوق التركيب الوراثي Tarsan 1018 معنوياً في صفة دليل الحصاد فقد أعطى أعلى معدل بلغ مقداره 40.31 % متفوقاً على كل من التركيبين الوراثيين Flame و

الزراعة فقد أعطى التركيب الوراثي Tarsan 1018 مع الموعد الزراعي الثالث أعلى معدل بلغ قيمته 53.25 . في حين سجل التركيب الوراثي Cartago مع الموعد الأول أقل معدل لهذه الصفة بلغ 25.36 .

بلغ 43.34 % في حين لم يختلف معنوياً عن بعضهم البعض كل من الموعد الأول [شباط] والموعد الثاني 15 شباط والرابع 15 آذار والخامس 1 نيسان بمعدلات 30.53 و 31.68 و 31.78 و 29.77 % على التوالي . اما عن تأثير التداخل بين التراكيب الوراثية مواعيد

جدول (6) تأثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية وتداخلهما في دليل الحصاد (HI) % لزهره الشمس				
متوسط المواعيد	Tarsan 1018	Cartago	Flame	موعد الزراعة
30.53	37.98	25.36	28.26	الاول 2/1
31.68	40.27	25.42	29.35	الثاني 2/15
43.34	53.25	35.91	40.84	الثالث 3/1
31.78	39.02	29.02	27.30	الرابع 3/15
29.77	31.05	30.26	28.01	الخامس 4/1
	40.31	29.19	30.75	متوسط الاصناف
	(المواعيد X الاصناف)	التراكيب الوراثية	المواعيد	قيمة L . s . d (0.05)
	7.36	3.29	4.25	

نضجت البذور في درجات الحرارة مرتفعة تقل المواد الكربوهيدراتية المتراكمة في البذور مما يؤدي وزيادة نسبة الزيت في البذور (الجبوري ، 1988). بوجود الضوء والحرارة المعتدلتين في الموعد الثالث اللذان يعدان عنصران اساسيان في المساعدة في تركيب الاحماض الدهنية . كما تؤدي إلى تجمع الزيت في البذور (كفاءة المصّب) بسبب الطاقة التي توفرها عملية التمثيل الضوئي ، فضلا عن ان صفة الزيت عامل وراثي مرتبط بالصفة اولاً مما يؤثر ايجابياً في نسبة الزيت . اما عن تأثير التداخل فقد أعطت التوليفة المتكونة من التركيب الوراثي Flame والموعد الثالث 1 آذار أعلى معدل بلغ 43.72 % لنسبة الزيت ، في حين أعطت التوليفة المتكونة من التركيب الوراثي Cartago والموعد الأول 1 شباط أقل معدل لهذه الصفة بلغ 38.13 %.

6-نسبة الزيت %
يبين جدول رقم (7) تفوق الصنف Flame في صفة نسبة الزيت الذي أعطى معدل بلغ 41.26 % في حين أعطى التركيب الوراثي Tarsan 1018 الذي أعطى معدل بلغ 40.74 % و أعطى التركيب الوراثي Cartago أقل معدل لهذه الصفة بلغ 39.09 % . ويعزى السبب في ذلك إلى اختلاف طبيعة التراكيب الوراثية ، واتفقت هذه النتيجة مع ما وجدته جدعان وآخرون (1990) و العبيدي (2000) . أما عن تأثير مواعيد الزراعة فقد أعطى الموعد الثالث 1 آذار أعلى معدل بلغ 41.99 % متفوقاً على المواعيد الاخرى المدروسة في حين سجل الموعد الخامس 1 نيسان أقل معدل لهذه الصفة بلغ 39.30 % . ويعود سبب الاختلاف إلى التغيرات في درجات الحرارة أثناء نضج وتكوين البذور ، إذ كلما

جدول رقم (7). تأثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية وتداخلهما في النسبة المئوية للزيت % لزهره الشمس				
متوسط المواعيد	Tarsan 1018	Cartago	Flame	موعد الزراعة
39.58	40.03	38.13	40.59	2/1
39.70	40.16	39.08	39.88	2/15
41.99	42.14	40.12	43.72	3/1
41.23	41.91	39.46	42.31	3/15

39.30	39.45	38.67	39.78	4/1
	40.74	39.09	41.26	متوسط الاصناف
(المواعيد X الاصناف)		التراكيب الوراثية	المواعيد	قيمة
0.80		0.35	0.46	L . s . d
				(0.05)

الاستنتاجات

من النتائج المتحصل عليها تبين ما يأتي:-

- 1 - ان زراعة محصول زهرة الشمس من الافضل زراعتها في الاول من آذار وذلك للزيادة المتحققة في حاصل الحبوب تحت ظروف محافظة المثني وان تأخير الزراعة حتى منتصف آذار ادى إلى تقليل الحاصل الكلي للزيت .
- 2 - الصنف Flame فقد كان الافضل في صفات الحاصل ومكوناته ونسبت الزيت.
- 3 - اعطت التوليفة المتكونة من الصنف Flame × الموعد الثالث المزروع في 1 آذار أفضل تداخل لحاصل البذور للنبات والحاصل الكلي ونسبة الزيت .

المصادر

الساهوكي، مدحت مجيد، فرانسيس وأراها وعبد محمود 1996. استجابة زهرة الشمس لمسافات الزراعية والتسميد. مجلة العلوم الزراعية. (27): 113-28.

الراوي، وجية مزعل حسن، 1998. ارشادات في الزراعة زهرة الشمس. نشرة ارشادية رقم (8) الهيئة العامة للإرشادات والتعاون الزراعي، وزارة الزراعة.

العبيدي، روافد هادي قاسم 2000. استجابة اصناف هجينية من زهرة الشمس *Helianthus annuus* L. لمواعيد الزراعة الربيعية. رسالة ماجستير كلية الزراعة -جامعة البصرة.

cytoplasmic. malesterile sun flower (*Helianthus annuus* L.) www. ivsl. org. (Online) 2003

Syed, A.S., M. Shahid, A. Jan and Nooruddin S., 2000. Effect of Various Levels of Nitrogen, phosphors and potassium (NPK) on growth, Yield and yield components of sun flower. *Pakistan Jornal of Biological Sciences.*, vol.3, (2), Pp. 338_339 .

Schneiter, A.A. and Miller, J.F. 1981. Description of sunflower growth Stage. *Crop Sci.* (21), Pp. 901-903.

الجبوري، ابراهيم عيسى، 1988. تأثير مواعيد الزراعة ومراحل النضج على نوعية الزيت والحاصل ومكوناته لمحصول عباد الشمس *Helianthus annuus* L. رسالة ماجستير كلية الزراعة جامعة بغداد.

العودة، ايمن الشحاذة، مها لطفي حديد، يوسف نمر 2009. المحاصيل الزيتية والسكرية وتكنولوجياها (الجزء النظري). جامعة دمشق. منشورات جامعة دمشق، كلية الهندسة الزراعية ع ص = 503

جدعان، حامد محمود وخالد ابراهيم هاشم وكوكب عبد الغني احمد 1990. تأثير مواعيد الزراعة في نسبة الزيت والحوامض الدهنية لأصناف عباد الشمس مجلة العلوم الزراعية العراقية المجلد 21(1)، 44-48.

رشيد، رزكار حميدي، ومحمد عبد الستار محمد 1994. تأثير الكثافة النباتية والاصناف في بعض صفات الحاصل زهرة الشمس تحت الظروف الاروائية، مجلة زراعة الرافدين، 26: 81-86.

طيفور، حسين عوني، ورزكار حميدي رشيد 1990. المحاصيل الزيتية -دار الكتب للطباعة والنشر. جامعة الموصل.

عزيز، فرنسيس اوراه، 2002. قوة الهجين وقابلية الاتحاد في زهرة الشمس، رسالة ماجستير. كلية الزراعة -جامعة بغداد.

عبد المجيد، علاء الدين وفوزي عبد الحسين كاظم ورياض جبار منصور المالكي 2011. تقييم تأثير مواعيد الزراعة على الحاصل ومكوناته لتراكيب وراثية من زهرة الشمس *Helianthus annuus* L. مجلة القادسية للعلوم الزراعية (1) : 11-21.

Abdel-Motgally and Osman 2010. Effect of Nitrogen and potassium fertilization Combination on productivity of two sunflower cultivars under east of Elewinat condition. *Amewican Eurasian J. Agric and Environ sci.* 8 (4), Pp.397-401

Katerj, N, Van Horne, J., Hamdy W., Amastrorilli, M., 2000. Salt tolerance classification of crops .Comparison of their effects on the relationship between yield evapotran spirition. *Agric manage.*(936), Pp. 45-54.

Meric, C., Dane, F., olgun, G. 2003. Histological aspects of antger wall in male fertile and.