



Effect Of Planting Date And Distance Between Hills On Growth and Forage Yield Of Sudangrass

Hybrid (*Sorghum vulgare* var. *sudanense*)

Salam Hameed Abdulla, *Sundus A.Alabdulla and Haitham A.Ali*

Field Crops Dept. College of Agriculture- Basrah University, Iraq*

Article Info.

Received
2019 / 8 / 1
Accepted date
2019 / 9 / 22

Keywords

Sudangrass,
Hybrid,
Sowing Date,
Distance

Abstract

This study was conducted in the experimental field of Agriculture Faculty, Wasit University (Wasit Governorate Center) in the autumn season 2018, to study the effect of four planting dates (June 25, July 10, July 25 and August 10) and four spacing between hills (10, 15, 20 and 25 cm) on growth and forage yield of Sudan grass Hybrid. The experiment was carried out by using split-plots with R.C.B.D design with three replicates, the planting dates were put in the main plots, and distances between hills were placed in the sub plots. Two cuts were taken from all treatments, the following traits were studied, Plant height, number of tillers per plant, number of leaves per plant, plant leaf area, leaves/stems ratio, and green forage yield. Planting date on 25 July at 1st cutting gave the highest studied characteristics and green yield were 89.452 t. ha-1, Planting date on 25 June at the 2nd cutting gave the highest studied characteristics and gave green forage yield about 86.090 t.ha-1. Planting at 20cm showed a significant effect among the other distances in most growth characteristics at the 1st and 2nd cutting and gave the highest green forage yield were 85.255 and 58.900 t. ha-1. The distance of 20 cm at the date of June 25 gave the highest green yield, which were 93.200 t. ha-1. The interaction between studied factors showed a significant effect on the green forage yield at 1st cutting, the distance of 20 cm at the date of June 25 gave the highest green yield, which were 93.200 t. ha-1, with an increase of 37.67% over than June 25 date, at a distance of 10 cm, the lowest yield of green fodder was recorded at 67.707 t. ha-1

*Part of M.Sc. thesis of the first author

Corresponding author: E-mail(

) Al- Muthanna University All rights reserved

تأثير مواعيد الزراعة والمسافات بين الجور في نمو وحاصل العلف لهجين حشيشة السودان *Sorghum vulgare* var. *sudanense*

سلام حميد عبد الله العائدي و سندس عبد الكريم محمد العبدالله وهيثم عبد السلام علي
قسم المحاصيل الحقلية - كلية الزراعة - جامعة البصرة-البصرة-العراق

أجريت هذه الدراسة في حقل التجارب الخاص بكلية الزراعة جامعة واسط (مركز محافظة واسط) في الموسم الخريفي 2018 ، لدراسة تأثير أربعة مواعيد زراعة (25 حزيران و10 تموز و25 تموز و10 آب) وأربع مسافات بين الجور (10 و15 و20 و25 سم) في نمو وحاصل العلف لهجين حشيشة السودان . طبقت التجربة بتصميم القطاعات الكاملة المعشاة (R.C.B.D) بترتيب الألواح المنشقة Split-Plot Design بثلاثة مكررات، تضمنت الألواح الرئيسية (Main plots) مواعيد الزراعة أما مسافات الزراعة بين الجور فوضعت في الألواح الثانوية (Sub plots). أخذت حشيتان من كل معاملة , وتمت دراسة صفات ارتفاع النبات وقطر الساق وعدد التفرعات وعدد الأوراق للنبات والمساحة الورقية للنبات ونسبة وزن الأوراق الى وزن السيقان وحاصل العلف الأخضر. تفوق موعد الزراعة 25 تموز معنوياً عند الحشة الأولى على المواعيد الاخرى معطياً أعلى القيم لصفات الدراسة، كما سجل أعلى حاصل علف اخضر بلغ متوسطه 89.452 طن هـ⁻¹، وتفوق موعد الزراعة 25 حزيران عند الحشة الثانية معطياً أعلى القيم لصفات الدراسة وسجل أعلى حاصل علف اخضر (86.090 طن هـ⁻¹). المسافة 20 سم بين الجور سجلت أعلى حاصل علف اخضر لكلا الحشتين بلغ 85.255 و58.900 طن هكتار⁻¹ للحشتين بالتتابع. كان التداخل معنوياً عند الحشة الأولى فقط ، حيث تفوق الموعد 25 تموز عند المسافة 20 سم بين الجور واعطى أعلى حاصل علف اخضر مقداره 93.200 طن هكتار⁻¹ ونسبة زيادة 37.67 % عن الموعد 25 حزيران عند المسافة 10 سم التي سجلت أقل حاصل علف اخضر بلغ 67.707 طن هكتار⁻¹.

*البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الأول

المقدمة:

تعد حشيشة السودان *Sorghum vulgare* var. *sudanense* إحدى مجاميع الذرة البيضاء التي تتبع العائلة النجيلية (Poaceae)، ومن محاصيل العلف غزيرة النمو والتفرع، وتتشابه في كثير من الصفات الخضرية والكيمائية بالذرة البيضاء *Sorghum bicolor* مما مكن من إنتاج بعض الهجن بينهما، ان هجين حشيشة السودان ناتج من تضريب الذرة البيضاء مع حشيشة السودان *Sorghum bicolor* x *Sudanese* وأكتسب هذا الهجين صفات تعدد الحشات وغزارة ووفرة الحاصل من حشيشة السودان ومقاومة الجفاف والملوحة من الذرة البيضاء، ويمتاز بوفرة حاصلة من العلف الاخضر والجاف، فضلاً عن انخفاض محتواه من حامض الهيدروسيانيك مما يجعله صالحاً للرعي او علف اخضر او عمل الدريس والسايلاج (Smith و Frederiksen، 2000)، كما أنه من نباتات C₄ التي تمتاز بكفاءتها العالية في استغلال الطاقة الشمسية (Westfall و Davis، 2005). أن تحديد موعد الزراعة الملائم هو أحد العوامل الرئيسة المؤثرة في حاصل العلف الاخضر، وذلك لما لموعدهم الزراعة من تأثير في نمو النبات بسبب التغيرات التي تحدث للظروف المناخية كدرجة الحرارة والفترة الضوئية التي تتزامن مع اختلاف موعد الزراعة والتي تؤثر في معظم الفعاليات الحيوية التي تجري في النبات (عطية و وهيب، 1989)، أشار عبد الله (2004) الى ان موعد الزراعة 1 ايار سجل اعلى حاصل علف اخضر لحشيشة السودان بلغ 83.46 طن هـ⁻¹ في حين سجل الموعد الاول 1 نيسان اقل متوسط للصفة بلغ 49.48 طن هـ⁻¹، وبين هادف (2013) عند زراعة الذرة البيضاء بأربعة مواعيد زراعة (1 تموز و 10 تموز و 20 تموز و 30 تموز) ان موعد الزراعة 30 تموز أعطى اعلى ارتفاع النبات ومساحة ورقية بلغ 156.20 سم و 597.60 سم² على التتابع. وللكتافة النباتية أهمية في كونها ذات تأثير كبير في تحديد قابلية المحصول على استغلال الموارد المتاحة للنبات كالماء والعناصر الغذائية والإضاءة ومن ثم تحديد عدد النباتات المناسبة في وحدة المساحة لإنتاج انسب كمية من العلف وبنوعية جيدة. حصل بكتاش واخرون (2009) عند الزراعة الخريفية لهجن الذرة البيضاء العلفية وحشيشة السودان على اعلى حاصل للعلف الاخضر عند المسافة 15 سم بين النباتات وللحشة الاولى والثانية ومجموع الحشتين مقداره 27.75 و 12.40 و 40.15

طن هـ⁻¹ بالتتابع، في حين سجلت المسافة 10 سم أقل القيم مقدارها 22.10 و 10.75 و 32.85 طن هـ⁻¹ بالتتابع. ان ادخال محاصيل علفية جديدة وتجربة مدى ملائمتها للزراعة تحت ظروف البيئة العراقية ومنها حشيشة السودان، فضلاً عن انخفاض إنتاجية ومحدودية الموارد العلفية وعجزها عن تلبية الاحتياجات الغذائية الكافية للحيوانات بسبب الطلب المتزايد عليها، بذلك يمكن أن يعد محصول حشيشة السودان العلفي من اهم المحاصيل الصيفية النجيلية التي يمكن ان تساهم في حل جزء من هذا العجز، لذا هدفت الدراسة الى معرفة أفضل موعد للزراعة وأنسب كثافة نباتية والتداخل بينهما والتي يمكن من خلالهما الحصول على أعلى حاصل من العلف الأخضر لهجين حشيش السودان .

المواد وطرائق العمل:

نُفِدت تجربة حقلية في حقل كلية الزراعة جامعة واسط في تربة في تربة مبينة مواصفاتها في جدول (1) ، بهدف دراسة تأثير مواعيد الزراعة (25 حزيران و 10 تموز و 25 تموز و 10 آب) والمسافات بين الجور (10 سم و 15 سم و 20 سم و 25 سم) في نمو وحاصل العلف لهجين حشيشة السودان، طبقت التجربة بأسلوب الألواح المنشقة باستعمال تصميم القطاعات الكاملة المعشاة وبثلاثة مكررات، تضمنت الألواح الرئيسة مواعيد الزراعة أما الألواح الثانوية فتضمنت مسافات الزراعة بين الجور، تم تهيئة التربة للزراعة وذلك بحراستها وتنعيمها وتسويتها، وقُسمت الى ألواح بمساحة 9م²، اشتملت على 6 خطوط بطول 3 م للخط الواحد وبمسافة 50 سم بين خط وآخر، زرعت بذور هجين حشيش السودان (FSG 214 BMR6) المنتج من شركة Fito الإسبانية و المستورد من قبل شركة الريف الخضراء /بغداد حسب المواعيد وذلك بوضع 2 — 3 بذرة في الجورة وبعد أسبوعين من الزراعة خفت النباتات إلى نبات واحد ، أستعمل سماد اليوريا (N%46) مصدراً للسماد النايتروجيني بمعدل 200كغم N هـ⁻¹ أضيف على ثلاث دفعات متساوية ، الأولى عند الزراعة والثانية بعد الحشة الأولى والثالثة بعد الحشة الثانية، كما اضيف سماد السوبر فوسفات الثلاثي (P₂O₅%46) بمعدل 100 كغم P₂O₅ هـ⁻¹ عند الزراعة بدفعه واحده، و اضيف السماد البوتاسي على هيئة كبريتات البوتاسيوم 41% K (K₂SO₄) عند الزراعة وبمعدل 200 كغم K هـ⁻¹

(بكتاش وآخرون، 2009)، وأجريت عمليات الري والتعشيب حسب الحاجة ، كما كوفحت حشرة حفار ساق الذرة بمبيد الديازينون السائل بمقدار 1.5 سم³ لتر⁻¹ مرتين بعد 10 و 30 يوماً من الانبات (دليل مكافحة الآفات الزراعية، 2006).

جدول (1) بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة

الصفة	القيمة	الوحدة
pH	7.13	
الأصلحية الكهربائية E.C	2.13	ديسي سيمنز م ⁻¹
النيتروجين الجاهز (NO ₃ ⁻ + NH ₄ ⁺)	82.00	ملغم كغم ⁻¹
رمل	618.0	غم كغم ⁻¹ تربة
مفصولات التربة	210.7	
طين	171.3	
نسجة التربة	مزيجة رملية	

جدول(2) المعدلات الشهرية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة النسبية والتجمع الحراري ومجموع الاشعاع الشمسي الشهري خلال الموسم 2018**

الأشهر	درجات الحرارة العظمى (م°)	درجات الحرارة الصغرى (م°)	معدل درجات الحرارة (م°)	معدل الرطوبة النسبية %	التجميع الحراري (م°)	مجموع الأشعاع الشمسي الشهري ميكاجول م ⁻² يوم ⁻¹
حزيران	43.84	28.08	35.96	15.72	1078.85	22.61
تموز	47.83	31.67	39.75	14.265	1232.23	23.39
آب	47.65	30.50	39.075	14.84	1261.43	24.03
أيلول	44.17	25.30	34.735	19.05	1042.05	19.81
تشرين الاول	35.43	18.73	27.08	27.795	833.98	16.54
تشرين الثاني	26.73	12.27	19.5	45.735	573.89	9.81
كانون الاول	22.64	7.56	15.1	48.995	446.26	9.21

** الهيئة العامة للأحواء الجوية / دائرة انواء محافظة واسط

أخذت حشتان للنبات الأولى بعد 65 يوم من الزراعة والثانية بعد شهر من الحشة الأولى (حسب النشرة الإرشادية للهجين) ولجميع مواعيد الزراعة وكان الحش يدويا بارتفاع 10 – 15 سم من سطح التربة (رضوان والفخري، 1976) وتم دراسة الصفات الآتية:

أخذت خمسة نباتات من محصول حشيش السودان من الخطوط الوسطية وبصورة عشوائية ولكل لوح عند كل حشه وتم قياس الصفات التالية :

ارتفاع النبات (سم): قيسرت ارتفاعات النباتات بشرط قياس مدرج مدرجة بالسنتيمترات ابتداءً من سطح التربة حتى نهاية أعلى الورقة (الدليمي والنمراوي، 2014).

عدد التفرعات (فرع نبات⁻¹): حسب كمتوسط لعدد أفرع للنباتات الخمسة المختارة.

المساحة الورقية (سم²): قيسرت مساحة أوراق النباتات الخمسة وذلك حسب طريقة (Liang وآخرون، 1973) باستعمال المعادلة الآتية:

مساحة الورقة = أقصى طول الورقة × أقصى عرض × 0.75
عدد الاوراق (ورقة نبات⁻¹): حسب كمتوسط لعدد الأوراق للخمسة نباتات التي أختيرت عشوائياً.

نسبة الاوراق الى السيقان (على اساس الوزن الجاف): حسبت على اساس الوزن الجاف للخمسة نباتات التي أختيرت عشوائياً من الخططين الوسطيين وحسبت نسبة الاوراق الى السيقان.

حاصل العلف الاخضر لكل حشه (طن ه⁻¹): تم حش نباتات خططين الوسطيين ولكل حشه، ثم وزن حاصل العلف الاخضر مباشرة بعد الحش لضمان عدم فقدان جزء من الرطوبة نتيجة التبخر وعلى اساس ذلك تم حساب حاصل العلف الاخضر وبعدها جرى تحويل الوزن على أساس (طن ه⁻¹).

النتائج والمناقشة

ارتفاع النبات (سم)

تشير نتائج جدول 3 ان الموعد الثالث 25 تموز سجل اعلى متوسط ارتفاع نبات بلغ 194.13 سم ولم يختلف معنوياً عن الموعد 10 آب ونسبة زيادة 39.75% قياساً بالموعد 25 حزيران الذي سجل اقل ارتفاع بلغ 138.91 سم، وربما يعود السبب الى الظروف البيئية المناسبة التي رافقت الإنبات والنمو خاصة درجات الحرارة والرطوبة حتى موعد الحشة الأولى (جدول 2)، مما أتاح الفرصة الكافية للنبات خلال هذا الموعد بالاستمرار بالنمو والاستطالة وزيادة فعالية وكفاءة عملية التمثيل الضوئي وزيادة إنتاج المادة الجافة التي أدت بدورها إلى زيادة معدلات النمو (محسن وآخرون، 2012) وهذا انعكس بشكل واضح على زيادة ارتفاع النبات. أما عند الحشة الثانية تفوق موعد الزراعة 25 حزيران وسجل اعلى ارتفاع للنبات بلغ 145.87 سم ونسبة زيادة 60.25% عن موعد الزراعة 10 آب الذي سجل اقل ارتفاع بلغ 91.03 سم، وقد يرجع سبب زيادة الارتفاع الى ملائمة الظروف البيئية (درجة الحرارة والتجميع الحراري والإشعاع الشمسي الشهري) (جدول 2) التي ربما اثرت في زيادة نمو النباتات والذي انعكس في زيادة الارتفاع، في حين أنخفض ارتفاع النباتات عند الموعد 10 آب بسبب الانخفاض النسبي بدرجات الحرارة والتجميع الحراري والإشعاع الشمسي الشهري وبذلك سوف تؤدي هذه العوامل الى

قصر مدة التمثيل الضوئي وبطأ معدلات النمو وقلة انتاج المادة الجافة مما انعكس على قلة ارتفاع النبات. كما بينت نتائج جدول 3 ان المسافة 10 سم بين الجور حققت اعلى ارتفاع نبات ولكلا الحشتين بلغ 190.95 و 132.68 سم، في حين سجلت المسافة 25 سم اقل ارتفاع بلغ 169.90 و 116.88 سم للحشتين بالتتابع، ويعزى سبب ذلك الى ان زيادة عدد النباتات في وحدة المساحة تزيد من التظليل وهذا بدوره يؤدي الى زيادة التنافس بين النباتات على متطلبات النمو ومنها الضوء مما دفع النباتات للاستطالة للحصول على اكبر قدر ممكن من الاحتياجات الضوئية، كما أن زيادة ارتفاع النبات في الكثافة العالية قد يحدث نتيجة التظليل وقلة الضوء الواصل إلى الأوراق السفلى فيؤدي إلى استطالة السلاسل بفعل الأوكسينات مما يزيد ارتفاع النبات، وهذا يتفق Salem (2015) واحمد وعبود (2016). أظهر التداخل بين مواعيد الزراعة والمسافات بين الجور تأثيراً معنوياً في ارتفاع النبات ولكلا الحشتين فحقق موعد الزراعة 25 تموز عند المسافة 10 سم بين الجور اعلى ارتفاع للنبات مقداره 210.80 و 154.93 سم للحشتين بالتتابع، في حين سجل الموعد 25 حزيران والمسافة 25 سم بين الجور اقل ارتفاع للنبات بلغ 125.93 سم للحشة الأولى، اما اقل قيمة للتداخل عند الحشة الثانية فكان عند الموعد الرابع (10 آب) و المسافة 25 سم (84.43 سم).

جدول (3) ارتفاع النبات (سم) تحت تأثير مواعيد الزراعة والمسافات بين الجور والتداخل بينهما

الحشات	المسافات بين الجور (سم)	مواعيد الزراعة			متوسط المسافات
		25 حزيران	10 تموز	25 تموز	
الأولى	10	152.40	200.00	210.80	190.95
	15	141.60	185.60	191.07	177.6
	20	135.73	183.33	189.27	174.08
	25	125.93	180.60	185.40	0169.9
	متوسط المواعيد	138.91	187.38	194.13	192.10
الثانية	10	154.93	143.80	134.07	132.68
	15	153.13	139.53	126.47	128.87
	20	142.53	135.47	120.47	120.97
	25	132.87	134.47	115.73	116.88
	متوسط المواعيد	145.87	138.32	124.18	91.03
أقل فرق معنوي 0.05%					
للمواعيد		2.77	الحشة الثانية		
للمسافات		2.27	2.85		
للتداخل		4.53	1.82		
			3.95		

عدد الأفرع (فرع نبات¹):

توضح نتائج جدول 4 ان الموعد 25 تموز سجل اعلى عدد تفرعات ولكلا الحشتين بلغ 5.39 و 14.01 فرع نبات¹- بالتتابع، في حين سجل الموعد 25 حزيران عند الحشة الأولى اقل عدد تفرعات مقدارها 4.69 فرع نبات¹-، وسجل الموعد 10 آب عند الحشة الثانية اقل عدد بلغ 8.48 فرع نبات¹-، وقد يعود سبب زيادة عدد التفرعات عند الموعد 25 تموز الى ملائمة درجة الحرارة والرطوبة إذ انخفضت معدلات درجات الحرارة من 34.73°م لشهر ايلول الى 27.08°م لشهر تشرين الأول وزيادة الرطوبة النسبية في شهر تشرين الأول بمقدار 45.91% عن شهر ايلول (جدول 2)، كل هذه العوامل أدت الى زيادة النمو الخضري والتي انعكست في زيادة عدد التفرعات. تشير نتائج الجدول 4 ان الزراعة بمسافة 20 سم بين الجور سجلت

اعلى عدد تفرعات بلغ 5.76 و 13.34 فرع نبات¹- للحشتين بالتتابع، في حين سجلت المسافة 10 سم بين الجور اقل عدد بلغ 4.03 و 9.43 فرع نبات¹- للحشتين بالتتابع، ويمكن أن يعزى السبب إلى ان زيادة المسافة بين الجور سمح لها بنمو جيد انعكس على زيادة مقدرتها على التفرع لحصولها على متطلباتها الغذائية في التربة بصورة أفضل من المسافة الضيقة 10سم، وهذا يتفق مع Zandi وآخرون (2013). أظهر التداخل بين مواعيد الزراعة والمسافات بين الجور تأثيراً معنوياً في عدد التفرعات عند الحشة الثانية فقط ، اذ سجل الموعد 25 حزيران عند المسافة 20 سم بين الجور اعلى عدد تفرعات بلغ 16.10 فرع نبات¹- والتي لم تختلف معنوياً عن المسافة 25 سم لنفس الموعد والتي اعطت 15.73 فرع نبات¹- وبنسبة زيادة 156.78% عن الموعد 10 آب عند المسافة 10 سم بين الجور التي سجلت اقل عدد تفرعات بلغ 6.27 فرع نبات¹-.

جدول (4) عدد التفرعات (فرع نبات¹) تحت تأثير مواعيد الزراعة والمسافات بين الجور والتداخل بينهما

الحشات	المسافات بين الجور(سم)	مواعيد الزراعة			متوسط المسافات
		25 تموز	10 تموز	10 آب	
الاولى	10	3.33	3.97	4.33	4.03
	15	4.73	5.10	5.53	5.14
	20	5.57	5.50	6.23	5.76
	25	5.13	5.30	5.47	5.13
	متوسط المواعيد	4.69	4.97	5.39	5.00
الثانية	10	11.60	12.47	7.40	9.43
	15	12.60	13.67	8.80	10.90
	20	16.10	15.00	12.20	13.34
	25	15.73	14.63	11.63	12.77
	متوسط المواعيد	14.01	13.94	10.01	8.48
	LSD 0.05%	الحشة الاولى		الحشة الثانية	
للمواعيد	0.984	0.626			
للمسافات	0.614	0.390			
للتداخل	ns	0.856			

عدد الأوراق (ورقة نبات¹): توضح نتائج جدول 5 الى ان موعد الزراعة 25 تموز سجل اعلى عدد اوراق بلغ 66.74 ورقة نبات¹-، وبنسبة زيادة 20.88 % عن الموعد 25 حزيران الذي سجل اقل متوسط بلغ 55.21 ورقة نبات¹-، كما سجل اعلى عدد اوراق عند الحشة الثانية في الموعد 25 حزيران مقداره 98.95 ورقة نبات¹- بنسبة زيادة 62.82% عن الموعد 10 آب

الذي سجل اقل متوسط بلغ 60.77 ورقة نبات¹-، وقد يعود السبب الى زيادة ارتفاع النبات (جدول 3) وعدد التفرعات (جدول 4) والتي ترتبط كلا الصفتين إيجابياً مع عدد الاوراق بالنبات. بينت نتائج جدول 5 ان الزراعة عند المسافة 20 سم بين الجور سجلت اعلى متوسط عدد اوراق بلغ 64.03 و 85.4 ورقة نبات¹- للحشتين بالتتابع وبنسبة زيادة 8.74 % و 16.82

% عن المسافة 10 سم التي سجلت اقل متوسط بلغ 58.88 و73.17 ورقة نبات¹ بالتتابع، ان سبب الانخفاض قد يعود الى أن زيادة عدد النباتات في وحدة المساحة يؤدي الى تظليل الاوراق السفلية ووصولها الى مرحلة الشيخوخة وعدم قيامها بالبناء الضوئي (الدليمي والنمراوي 2014)، فضلاً عن قلة عدد التفرعات (جدول 4) التي ربما ادت الى قلة عدد الاوراق. كان

التداخل معنوياً عند الحشة الثانية فقط، واعطى الموعد 25 حزيران عند المسافة 20 سم بين الجور اعلى متوسط بلغ 100.07 ورقة نبات¹، ولم يختلف معنوياً عن جميع المسافات لنفس الموعد والمسافتين 20 و25 سم عند الموعد 10 تموز في حين سجل الموعد 10 آب عند المسافة 10 سم سجلت اقل متوسط عدد اوراق بلغ 47.93 ورقة نبات¹.

جدول (5): عدد الاوراق (ورقة نبات¹) تحت تأثير مواعيد الزراعة والمسافات بين الجور والتداخل بينهما

الحشات	المسافات بين الجور (سم)	مواعيد الزراعة				متوسط المسافات
		25 حزيران	10 تموز	25 تموز	10 آب	
الاولى	10	51.87	55.80	64.27	63.60	58.88
	15	53.77	59.70	66.07	64.57	61.02
	20	57.73	63.40	68.80	66.20	64.03
	25	57.47	60.67	67.80	65.77	62.93
	متوسط المواعيد	55.21	59.89	66.74	65.04	
الثانية	10	97.87	81.00	65.87	47.93	73.17
	15	97.93	92.87	68.67	58.33	79.45
	20	100.07	96.93	74.20	70.73	85.48
	25	99.93	95.73	72.33	66.07	83.52
	متوسط المواعيد	98.95	91.63	70.27	60.77	
0.05 LSD %		الحشة الاولى		الحشة الثانية		
للمواعيد		2.84		4.66		
للمسافات		1.04		2.25		
للتداخل		ns		5.61		

المساحة الورقية (سم²): تشير نتائج جدول 6 ان الموعد 25 تموز سجل اعلى مساحة ورقية بلغت 16032 سم² ولم يختلف معنوياً عن الموعدين 10 تموز و10 آب، في حين سجل الموعد 25 حزيران اقل متوسط بلغ 12927 سم²، وقد يعود سبب الزيادة الى زيادة عدد الاوراق (جدول 5) فضلاً عن ملائمة درجة الحرارة والرطوبة والتي ساعدت على تنشيط انقسام خلايا الاوراق وزيادة حجمها واستمرار النمو الخضري وزيادة عددها (جدول، 5) مما زاد من مساحتها الورقية. أما عند الحشة الثانية فتفوق الموعد 25 حزيران وسجل 14269 سم² وبنسبة زيادة 22.38 % عن الموعد 10 آب الذي سجل اقل متوسط بلغ 11659 سم². تبين نتائج جدول 6 ان المسافة 20 سم بين الجور سجلت اعلى متوسط للمساحة الورقية ولكلا الحشتين بلغ 17309 و14235 سم² بالتتابع بنسبة زيادة 24.64 و 41.61

% عن المسافة 10 سم التي سجلت اقل مساحة ورقية مقدارها 11420 و12223 سم² للحشتين بالتتابع، ويعود سبب الانخفاض الى زيادة التنافس بين النباتات على متطلبات النمو المختلفة مما يؤثر في المساحة الورقية للنبات (عيسى، 1990). اتفقت هذه النتيجة مع نهابة (2004) وجياد (2008) والجبوري والزبيدي (2013). كان التداخل معنوياً عند الحشة الثانية فقط، فسجل الموعد 10 تموز عند المسافة 20 سم بين الجور اعلى مساحة ورقية مقدارها 15455 سم² ولم تختلف معنوياً عن الزراعة في الموعد نفسه عند المسافة 25 سم بين الجور (15116 سم²) والمسافتين 20 و25 عند الموعد 25 حزيران اذ سجلنا 15290 و15159 سم² على التتابع، في حين اعطى التداخل بين المسافة 25 سم عند الموعد 10 آب اقل مساحة ورقية مقدارها 11219 سم².

جدول (6): المساحة الورقية (سم²) تحت تأثير مواعيد الزراعة والمسافات بين الجور والتداخل بينهما

الحشات	المسافات بين الجور (سم)	مواعيد الزراعة				متوسط المسافات
		25 حزيران	10 تموز	25 تموز	10 آب	
الأولى	10	10641	12314	13407	12532	12223
	15	12486	14554	15695	14686	14355
	20	15826	17782	18409	17219	17309
	25	12756	15488	16618	16145	15252
	متوسط المواعيد	12486	14554	15695	14686	14355
الثانية	10	12841	10980	10407	11452	11420
	15	13786	13554	11695	11486	12630
	20	15290	15455	13718	12478	14235
	25	15159	15116	13409	11219	13726
	متوسط المواعيد	14269	13776	12307	11659	14269
0.05 LSD %		الحشة الأولى		الحشة الثانية		
للمواعيد		1172.7		244.0		
للمسافات		650.1		342.7		
للتداخل		ns		623.0		

نسبة وزن الأوراق الى وزن السيقان:

يلاحظ من النتائج المبينة في جدول 7 ان الموعد 25 تموز سجل اعلى نسبة وزن للأوراق الى وزن السيقان بلغت 0.71 بنسبة زيادة 20.33 % عن الموعد 25 حزيران الذي سجل اقل نسبة مقدارها 0.59 ، وربما يعود السبب في تفوق موعد الزراعة 25 تموز إلى الزيادة في كل من ارتفاع النبات (جدول،3) وعدد التفرعات (جدول،4) وعدد الاوراق (جدول،5) . أما عند الحشة الثانية فتفوق الموعد 25 حزيران واعطى اعلى نسبة بلغت 0.50 وبنسبة زيادة 21.95% عن الموعد 10 آب الذي سجل اقل نسبة مقدارها 0.41، وقد يرجع سبب ذلك إلى توفر الظروف البيئية المناسبة وخصوصاً درجة الحرارة خلال مدة

النمو، مما أدت إلى توفر فرصة نمو جيدة (الزيادة في عدد التفرعات وعدد الاوراق والمساحة الورقية) للنباتات المزروعة في الموعد 25 حزيران بعد الحشة الأولى أكثر من الموعد المتأخر (10 آب) الذي تميز بأن موعد الحشة الثانية لها تزامن مع انخفاض درجة الحرارة الأمر الذي انعكس سلبياً في قدرة النباتات على إعادة النمو وتنشيط البراعم الأبطية في النمو مرة أخرى. سجلت المسافة 10 سم اعلى نسبة وزن مقدارها 0.69 و0.49 بنسبة زيادة 15 و19.51 % عن المسافة 25 سم التي سجلت اقل نسبة بلغت 0.60 و0.41، وقد يرجع سبب الزيادة الى زيادة عدد النباتات في وحدة المساحة والتي انعكست ايجابياً في زيادة عدد الاوراق .

جدول (7): نسبة وزن الأوراق الى وزن السيقان تحت تأثير مواعيد الزراعة والمسافات بين الجور

الحشات	المسافات بين الجور (سم)	مواعيد الزراعة				متوسط المسافات
		25 حزيران	10 تموز	25 تموز	10 آب	
الأولى	10	0.65	0.66	0.75	0.69	0.69
	15	0.61	0.65	0.71	0.67	0.66
	20	0.57	0.61	0.69	0.64	0.63
	25	0.52	0.58	0.68	0.63	0.60
	متوسط المواعيد	0.59	0.63	0.71	0.66	

0.49	0.44	0.47	0.52	0.53	10	الثانية
0.47	0.43	0.46	0.49	0.51	15	
0.45	0.41	0.42	0.48	0.50	20	
0.44	0.37	0.41	0.47	0.49	25	
	0.41	0.44	0.49	0.50	متوسط المواعيد	
الحشة الثانية			الحشة الأولى		0.05 LSD %	
0.022			0.025		للمواعيد	
0.011			0.011		للمسافات	
ns			ns		للتداخل	

حاصل العلف الأخضر طن هـ-1:

بينت نتائج جدول 8 تفوق موعد الزراعة 25 تموز واعطى اعلى حاصل علف اخضر مقداره 89.452 طن هـ-1 وبنسبة زيادة 19.98 % عن الموعد 25 حزيران الذي سجل اقل حاصل بلغ 74.550 طن هـ-1 ، ويعود سبب تفوق الموعد 25 تموز في حاصل العلف الاخضر الى نمو النباتات خلال وقت تكون فيه العوامل المناخية مناسبة (جدول 2) مما انعكس ايجابياً في نمو النباتات فضلاً عن حصول زيادة ارتفاع النبات (جدول 3) وعدد التفرعات (جدول 4) وعدد الاوراق (جدول 5) والمساحة الورقية (جدول 6) والذي ادى الى زيادة حاصل العلف الأخضر للمحصول، واتفقت هذه النتيجة مع ما أشار اليه Ping آخرون (2005) في ان حاصل العلف لمحصول حشيشة السودان يزداد بزيادة ارتفاع النبات وعدد الاوراق والمساحة الورقية. كما اشارت نتائج الجدول 8 الى تفوق موعد الزراعة 25 حزيران مسجلاً اعلى حاصل علف اخضر بلغ 86.090 طن هـ-1 وبنسبة زيادة 209.08 % عن الموعد 10 آب الذي أعطى اقل حاصل علف اخضر مقداره 27.854 طن هـ-1 ، ويرجع سبب تفوق الموعد 25 حزيران الى ملائمة الظروف البيئية (درجات الحرارة ومجموع الاشعاع الشمسي الشهري والتجميع الحراري) والتي أدت الى زيادة معظم صفات النمو كارتفاع النبات وعدد التفرعات وعدد الاوراق والمساحة الورقية (جدول 3 و 4 و 5 و 6) والتي ادت الى زيادة كفاءة التمثيل الضوئي

الأمر الذي انعكس في زيادة حاصل العلف، على العكس من الموعد 10 آب الذي شهد عند موعد الحشة الثانية (15 تشرين الثاني) انخفاض معدل درجات الحرارة والتجميع الحراري وقصر الفترة الضوئية (19.50 م° و 573.98 وحدة حرارية و 9.81 ميكاجول م⁻² شهر⁻¹) (جدول، 2) والتي ادت الى انخفاض قيم صفات النمو المذكورة اعلاه، مما اثر سلباً في حاصل العلف الاخضر للنبات. تتفق هذه النتيجة مع جاسم وخريبط (2015). لوحظ من نتائج جدول 8 الى ان المسافة 20 سم بين الجور سجلت اعلى حاصل علف اخضر لكلا الحشتين بلغ 85.255 و 58.900 طن هـ-1 للحشتين بالتتابع ويعزى السبب الى زيادة معظم صفات النمو للنباتات المزروعة بالمسافة 20 سم (وعدد التفرعات وعدد الاوراق والمساحة الورقية) في زيادة حاصل العلف الأخضر. ، في حين حققت المسافة 10 سم بين الجور عند الحشة الأولى اقل حاصل علف اخضر مقداره 75.371 طن هـ-1 ، أما عند الحشة الثانية فسجلت المسافة 25 سم اقل حاصل علف اخضر مقداره 48.383 طن هـ-1. كان التداخل معنوياً عند الحشة الأولى فقط ، حيث تفوق الموعد 25 تموز عند المسافة 20 سم بين الجور واعطى اعلى حاصل علف اخضر مقداره 93.200 طن هكتار⁻¹ وبنسبة زيادة 37.67 % عن الموعد 25 حزيران عند المسافة 10 سم التي سجلت اقل حاصل علف اخضر بلغ 67.707 طن هـ-1.

جدول (8): حاصل العلف الاخضر (طن هـ-1) تحت تأثير مواعيد الزراعة والمسافات بين الجور

مواعيد الزراعة					متوسط المسافات
الحشات	المسافات بين الجور(سم)				
	25 حزيران	10 تموز	25 تموز	10 اب	

75.371	75.060	87.333	71.383	67.707	10	
78.170	76.737	88.580	75.543	71.820	15	
85.255	83.640	93.200	82.487	81.693	20	الأولى
80.295	78.073	88.693	77.433	76.980	25	
	78.378	89.452	76.712	74.550	متوسط المواعيد	
49.554	25.940	38.443	47.573	86.260	10	
53.010	29.500	40.653	54.630	87.260	15	
58.900	32.087	44.813	60.640	98.060	20	الثانية
48.383	23.887	43.743	53.123	72.780	25	
	27.8535	41.913	53.9915	86.090	متوسط المواعيد	
	الحشة الثانية	الحشة الأولى			0.05 LSD %	
	5.502	8.909			للمواعيد	
	3.862	8.332			للمسافات	
	ns	1.610			للتداخل	

المصادر:

- أحمد، ياسين عبد ونهاد محمد عبود (2016). أستجابة صنفين من الذرة البيضاء للكثافة النباتية *Moench Sorghum bicolor L*. مجلة الانبار للعلوم الزراعية ، 14 (2): 188-203.
- بكتاش، فاضل يونس و كريمة محمد وهيب (2004). أستجابة الذرة الصفراء لمستويات من السماد النيتروجيني والكثافات النباتية. مجلد العلوم الزراعية العراقية. 23 (1): 85-96.
- بكتاش، فاضل يونس و محمد هذال كاظم وموفق عبد الرزاق النقيب (2009). أنخال هجن الذرة البيضاء العلفية الى العراق. مجلة العلوم الزراعية العراقية، 40(3): 27-36.
- جاسم، أحمد محمد وحديد خلف خربيط (2015). تأثير مواعيد الزراعة ومراحل القطع في حاصل العلف الأخضر للذرة البيضاء صنف ابوسبعين-2 والمادة الجافة ونوعية العلف. مجلة العلوم الزراعية العراقية، 46(4): 484-493.
- الجبوري، رشيد خضير وصفاء عبد الحسن الزبيدي (2013). تأثير الكثافات النباتية في نمو وحاصل ونوعية العلف الأخضر لصنفين من الذرة البيضاء *Sorghum bicolor L. Moench*. مجلة الفرات للعلوم الزراعية، 5(2): 167-175.
- جيد، صدام حكيم (2008). تأثير حامض الجبريليك في حيوية وقوة الانبات لبذور الذرة البيضاء الناتجة من الكثافات النباتية المختلفة. رسالة ماجستير - جامعة بغداد كلية الزراعة.
- دليل مكافحة الافات الزراعية. (1980) الهيئة العامة لوقاية المزروعات. وزارة الزراعة، جمهورية العراق.
- الدليمي، نهاد محمد عبود و سامر احمد حسن النمراوي (2014). تأثير مراحل القطع والمسافة بين الجور في بعض صفات النمو وحاصل العلف للذرة البيضاء ، مجلة الانبار للعلوم الزراعية. المجلد:12 العدد(2): 234-245.
- رضوان، محمد السيد و عبد الله قاسم الفخري(1976). محاصيل العلف والمراعي. ج2. مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل.
- الرومي، ابراهيم احمد (2006). مدى استجابة نمو وحاصل ونوعية علف الذرة الصفراء للتسميد النيتروجيني والكثافة النباتية في مواعيد مختلفة. اطروحة دكتوراه - كلية الزراعة والغابات - جامعة الموصل .
- عبد الله، كامل عوض (2004). تأثير مواعيد الزراعة وحشة العلف على محصول الحبوب والعلف الرطب في حشيشة السودان. السجل العلمي للندوة السعودية الأولى للعلوم الزراعية (الزراعة السعودية بين التوسع والترشيد) (82): 91 - 99.
- عطية، حاتم جبار و كريمة محمد وهيب (1989). فهم إنتاج المحاصيل الجزء الأول، (كتاب مترجم) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة بغداد.
- عيسى، طالب احمد (1990). فسيولوجيا نباتات المحاصيل. (كتاب مترجم). جامعة بغداد. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كلية الزراعة. جامعة بغداد. العراق. ع ص 496 .
- محسن، خلدون ياسر، احمد حميد سعودي ومصطفى جواد نعمة (2012). تأثير مواعيد الزراعة في بعض الصفات الحقلية وحاصل العلف الأخضر لثلاث اصناف من الذرة البيضاء *Sorghum bicolor L. Moench*، مجلة ذي قار للبحوث الزراعية، 1(1): 23-33.
- نهابة، رافد صالح (2004). تأثير توزيع النباتات في نمو وحاصل الحبوب لثلاثة اصناف من الذرة البيضاء. رسالة ماجستير - قسم علوم المحاصيل الحقلية - كلية الزراعة - جامعة بغداد.
- هادف، وفيد مهدي ولمي رشيد لفته (2013). تأثير مواعيد الزراعة ومستويات من الشد الرطوبي على بعض صفات النمو الخضري والحاصل لمحصول الذرة البيضاء *Sorghum bicolor L*. مجلة جامعة ذي قار 2 (8): 18-35.
- Liang, G. H., C. C. Chu, N. S. Reddi, S. S. Lin, and A. D. Dayton. 1973. Leaf blade area of sorghum varieties and hybrids. *Agron. J.* 65: 456-459.

- Ping, J., Zhang, F., Cheng, Q., Du, Z., Lv, X. and Yuhui, C. Y. (2005). Performance of One Newly Developed Forage Variety Jincao 1 (*Sorghum/ sudangrass*) in China. *Asian J. of Plant Sci.*, 4(5):527-529.
- Salem, E. M. (2015). Response of grain sorghum (*Sorghum bicolor* L. moench) to irrigation nitrogen and plant density under new vally conditions, EGYPT. *Egyptian J. Desert Res*, 65(1), 11-30.
- Smith, C. W., and Frederiksen, R. A. (Eds.). (2000). Sorghum: Origin, history, technology, and production (Vol. 2). John Wiley & Sons.
- Westfall, D. G., and Davis, J. G. (2005). Fertilizing grain and forage sorghums Crop series Soil; no. 0.540
- Zandi, N., and Mohammad R. S. (2013). "Effect of plant density and nitrogen fertilizer on some attribute of grain sorghum (*Sorghum bicolor* (L.) Moench)." *International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research*. 1(12): 1577-1582.